

Guide: Forberedelser ved oppstart av ny pasient

Ansvarlig må informere og involvere hele det tverrfaglige Duodopa[®]-teamet, samt pasient i god tid før oppstart

- Det er viktig at alle kjenner godt til sin rolle i teamet og når i prosessen det forventes at hver og en utfører sin oppgave.
- Behandlende nevrologer, sykepleiere, radiologer, gastroenterologer/kirurger må ha tilstrekkelig informasjon om prosessen og kjenne til hvilken dato pasienten legges inn. Ved manglende eller uklar informasjon kontakt AbbVie eller supportsykepleier.
- Kontakt supportsykepleier i god tid før innleggelsen ved behov for undervisning og bistand under titreringen.
- Kall inn pasient og pårørende til informasjonsmøte.

Lag relevante interne avtaler og kall inn pasienten til testperioden

- Pasienter med fremskreden Parkinsons sykdom kan ha kraftig muskulær rigiditet, dystonier eller dyskinesier som kan vanskeliggjøre den endoskopiske prosedyren med innlegging av PEG/J. Sørg for at pasienten er optimalt forbehandlet. Det ideelle er å gi kontinuerlig infusjon med Duodopa[®] via en nasojejunal sonde helt til prosedyren starter. Dette går fint på tross av at det anbefales 8 timers faste - se under.
- Pasienter kan være underernært og dermed ha økt risiko for medisinske komplikasjoner ved alle typer inngrep. Vurder om pasienten trenger ekstra preoperativ ernæring. I enkelte tilfeller bør nytten av Duodopa[®]-behandling veies opp mot potensiell risiko forbundet med den kirurgiske prosedyren.

Undersøk lagerbeholdningen

Sørg for at følgende utstyr er tilgjengelig minst en uke før titreringen begynner :

For testfasen:

1. Sørg for levering og oppbevaring av Duodopa[®] på apoteket
2. Duodopa[®] pumpe (ha også reservepumper på lager)
3. Nasojejunal sonde og adapter (og noen reservesonder/adaptere)
4. Forlengelsesslanger
5. Tape (tensoplast) for å fiksure sonden
6. Treningspumpe og treningskassett
7. Ekstra batterier (størrelse AA) til pumpe
8. ON/OFF vurderingsskjema
9. Sjekk at dere har riktig bæreutstyr som pasienten kan prøve ut (bestillingsliste fra Abbvie)

PEG/J-plasseringsmateriale:

1. PEG-sett (2 per pasient)
2. Intestinalsonde, (2 per pasient)
3. Ekstra Y- og klikk-kobling
4. Sprøyter for å skylle intestinalsonde og PEG
5. WW-adaptore (hun/hun adaptore)
6. Lommeguide til pasient og instruksjoner for daglige rutiner
7. CADD-Legacy[®] Duodopa[®] kort pumpeveiledning til pasienten
(denne ligger inne i pumpeesken. Husk å ta ut den utgaven som er tiltenkt helsepersonell)